

新冠病毒（COVID-19）阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗

給將要接種疫苗人們的資料說明

官方文件

關於疫苗

新冠病毒阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可以防止人們因新冠病毒患病。該疫苗含有部份新冠病毒物質——稱為棘突蛋白的遺傳密碼。您不會因為疫苗而感染新冠病毒。

接種疫苗後，該棘突蛋白會在您的體內增生，人體的免疫系統會被訓練能夠識別該棘突蛋白。這有助您對抗新冠病毒。

疫苗分兩次注射，相隔約12週。

疫苗接種是自願的。為確保所有人免受新冠病毒的侵害，我們鼓勵所有18歲以上的人接受疫苗接種，但有些人屬於例外情況。

如果對疫苗有任何疑問，請向您的疫苗接種提供者或醫生（GP）諮詢。

疫苗的好處

研究表明，新冠病毒阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可以防止18歲以上的人們感染新冠病毒。就算接種疫苗的人感染新冠病毒，必須送醫治療的可能性也大大降低。

第一劑施打後2至3週，您將已受到保護，不受新冠病毒的侵害。一劑可提供顯著的短期保護，而兩劑則可提供最佳保障。我們還不知道阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗對預防感染新冠病毒的效用有多久。隨時間推移，我們會了解更多這方面的資訊。

由於並未存在100%有效的疫苗，因此您仍可能因新冠病毒患病，並在接種疫苗後將病毒傳播給其他人。

所以，保持以下新冠安全（COVIDSafe）的習慣非常重要：

- 與他人保持1.5米的距離
- 經常洗手
- 必要時戴口罩
- 如果您出現任何新冠病毒症狀，無論多輕微，都要接受檢測並待在家裡。

應注意的新冠病毒相關症狀包括發燒、發冷或盜汗、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕，以及喪失嗅覺或味覺或有變化。有些人可能還會出現頭痛、肌肉酸痛、鼻塞、噁心、嘔吐和腹瀉。

誰可以接種此疫苗

18歲以上的人可以接種新冠病毒的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

您的醫療護理提供者可以和您討論您是否應該接種疫苗。如果您是屬於以下情況，請向您的醫療護理提供者諮詢：

- 免疫力減弱
- 懷孕、母乳餵養或計劃懷孕
- 感染過新冠病毒
- 患有出血性疾病或正在服用稀釋血液的藥物（抗凝血劑）。

如果您曾在以下情況經歷過敏性休克（一種嚴重的過敏反應），就不應接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗：

- 上次接種相同的新冠病毒疫苗時過敏
- 接觸到新冠病毒疫苗的任何成份後過敏。

如果您以前對**任何其他**物質有過嚴重過敏反應，或使用腎上腺素自動注射器（例如EpiPen），則在接種疫苗後需要留下30分鐘，確保您沒有過敏反應。

兒童

目前新冠病毒阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗僅批准用於18歲以上人群。年齡不到的人群不能接種。該疫苗正在進行大齡兒童的試驗，但我們還沒有結果。

兒童患新冠病毒（尤其是重症）的風險低於成人。

接種疫苗

跟接種其他疫苗一樣，您的醫護提供者會在為您注射後檢查您的狀況，確保您感覺正常。大多數人只需要幾分鐘。

注射後，您可能會感到疼痛、發紅或腫脹、輕度發燒或頭痛。

如果您出現任何副作用，請告知您的疫苗接種提供者或其他醫療保健專業人員。您也可以回覆在接種疫苗後收到的SMS短訊。

疫苗安全

澳洲政府負責批准和購買新冠病毒疫苗。藥品管理局（TGA）是評估澳洲所有疫苗的機構。疫苗要獲得批准，必須是安全、有效且按照非常高的品質標準進行生產。

新冠病毒阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗已進行約17,000人參與的大型臨床試驗，被確認為安全有效。新冠病毒阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗和其他新冠疫苗都以安全、有效的方式開發。之所以取得了這樣的成果，是因為增加了疫苗研究的資金，並有大量的志願者從事研究。

新冠疫苗的安全性將持續受到監控。

若要收取本文的其他格式，請致電1300 651 160，若需使用全國轉接服務，請致電13 36 77或發送電郵至COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au。

維多利亞州政府（1 Treasury Place, Melbourne）授權並發佈。

©澳洲維多利亞州衛生部，2021年3月。